



当社のパイン粕サイレージとは

- パイン粕にタピオカ澱粉(水分調整剤)を混ぜた飼料です。
パイン粕は水分率が85%～90%と高く、水分調整が必要です。しかし脱水・乾燥などを行うことで良質な酵素やビタミンは失われてしまいます。タピオカ澱粉をブレンドすることで、パイン汁を吸収させ、良質な酵素・ビタミンを保ちます。
- プロメライン(タンパク分解酵素)を含んでいます。
摂取したタンパクの分解を助ける→ペプチドやアミノ酸になり吸収されやすい状態→消化率が向上→乳量増等が期待できます。
- PH4.0以下(3.5～3.8くらい)でかなりの酸性。
二次醗酵が起こりにくい。TMR作成後の放置や飼料給餌後の飼槽内の腐植時間を遅らせることにもなる(プロピオン酸のような役目になる)。

製品規格

| 規格 | フレコン重量 | フレコンサイズ | 積載量 |
|---------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 25kg | 900kg(in 25kg*36Bags) | 90*120*115cm (30*30*43cm/25kg) | 900kg*29Bags=26,100kg/40ft |
| 1,000kg | 1,000kg | 100*100*120cm | 1,000kg*26Bags=26,000/40ft |

分析値 (%) ※乾物表示です。

| MOISTURE | CP | TDN | ADF | NDF | CRUDE FAT |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 60 | 5.0 | 55 | 27 | 50 | 0.5 |

使用上の注意点

- ⚠ 廃汁によるサイレージの変色や何らかの結晶化が起こる場合がありますが、商品に影響はありません。
- ⚠ 1週間かけて、ゆっくりならし、牧草や稲わら等と併用することをおすすめします。
また、糞の状態やエサの喰い込み状況により給与量の調整をしてください。
- ⚠ 多量給餌の場合、1日中ルーメン内PHは酸性に大きく傾きます。
(どのような飼料でも適量とバランスです)